

Usted se sometió a una cirugía para eliminar o fragmentar sus cálculos renales, también conocida como ureteroscopia. Después de la cirugía, es posible que sienta cierto grado de dolor o molestia. En la mayoría de los pacientes, estos síntomas se pueden controlar con medicamentos.

Síntomas comunes después de la cirugía de cálculos renales



Dolor en la vejiga, parte baja del abdomen y/o zona lumbar



Sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga



Sensación de ardor al orinar



Presencia de sangre en la orina



Frecuencia y/o urgencia urinaria

Su médico puede recetarle los siguientes medicamentos opcionales para reducir sus síntomas

Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES)

- Excelentes para el manejo del dolor en el costado y el abdomen relacionado con los cálculos renales al reducir la inflamación

Ejemplos: Toradol, Ibuprofeno (Motrin), Naproxeno (Aleve), Diclofenaco

Acetaminofén*

- Controla el dolor en el costado y el abdomen después de la cirugía al bloquear las señales de dolor
- Muy efectivo cuando se combina con los AINES

*No tome más de 3000 mg de acetaminofén en un período de 24 horas.

Alpha Blockers

- Ayudan con el dolor en el costado, el dolor abdominal y los síntomas urinarios después de la cirugía mediante la relajación de los músculos de la vejiga y del uréter
- Ayudan a aliviar la molestia del stent
- Pueden ayudar al paso de fragmentos de cálculos renales

Ejemplos: Tamsulosin (Flowmax)

Anticolinérgicos

- Previenen los espasmos de la vejiga y el dolor vesical al evitar el movimiento muscular involuntario
- Ayudan a aliviar la molestia del stent

Ejemplos: Oxitobutinina (Ditropan) y Tolterodina (Detrol)

También se le puede recetar los siguientes medicamentos opcionales para ayudar a reducir sus síntomas:

Opioides^{++,+++}

- Controlan el dolor en el costado y el abdomen después de la cirugía al bloquear algunos receptores de dolor
- Pueden causar náuseas, vómitos, estreñimiento

Ejemplos: Norco, Vicodin, Oxycodone

Pyridium

- Esto ayuda a aliviar el dolor al orinar
- Puede hacer que la orina se vuelva de color naranja.

⁺⁺ Se recomienda una duración corta (menos de 3 días) para prevenir la dependencia

⁺⁺⁺ La mayoría de los pacientes pueden manejar los síntomas sin estos medicamentos.

Cuándo llamar a su médico



Escalofríos, fiebre superior a 101.5°F (38.6°C)



Dificultad o incapacidad para orinar



Náuseas, vómitos e incapacidad para beber o retener líquidos



Fugas constantes de orina



Dolor severo que no se alivia con medicamentos



Salida del stent



Este documento está diseñado para la educación de pacientes adultos. Para obtener información adicional sobre este recurso informativo o sobre la Michigan Urological Surgery Improvement Collaborative, por favor contáctenos a través de:

✉ musicurology@umich.edu  www.musicurology.com



A nonprofit corporation and independent licensee
of the Blue Cross and Blue Shield Association

El apoyo a MUSIC es proporcionado por Blue Cross Blue Shield of Michigan como parte del programa de Asociaciones de Valor de BCBSM. Aunque Blue Cross Blue Shield of Michigan y MUSIC trabajan en colaboración, las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por el autor no reflejan necesariamente las opiniones, creencias y puntos de vista de BCBSM o de cualquiera de sus empleados.

Copyright© 2024.